

令和7年度 営農情報（野菜）第2号（5月）

令和7年5月23日

JAあきがわ営農支援センター

1. 生育・病害虫

スイートコーン
タマネギ

スイートコーンの生育は概ね順調です。タマネギは一部の圃場でべと病やアザミウマ類の発生がみられています。

ジャガイモ

生育は概ね順調です。梅雨期に入ると疫病の発生が懸念されます。下記を参考に予防的防除をお願いします。

2. 注意事項など

ジャガイモ疫病の対策

葉、茎、イモに発生します。下葉に暗褐色の病斑ができます。雨が多いと広がりやすい病気です。地上部に発生した病斑より胞子が雨で地表に行き、イモの感染につながります。窒素が多く、風通しの悪い圃場で発病が助長します。

◎重点防除時期：5月下旬～6月中旬



主な登録農薬

（黒字:予防的効果、赤字：予防・治療的効果）

ジマンダイセン水和剤（M3、7日前、10回）

ダコニール1000フロアブル（M5、7日前、5回）

プロポーズ顆粒水和剤（40・M5、7日前、5回）

アミスター20フロアブル（11、7日前、3回）

ホライズンドライフロアブル（11・27、14日前、4回）

3. 気象情報

関東甲信地方1か月予報（5/24～6/23）：気象庁5/22発表

平均気温は平年並または高い確率 40%。期間の前半は平年とくらべ曇りや雨の日が多い。後半は同様に曇りや雨の日が多い。

→気温は高めの傾向で曇りや雨の日が多い予想です。