

令和8年度 営農情報（野菜）第3号（8月）

令和8年8月17日

JA あきがわ営農支援センター

1. 生育・病害虫

スイートコーン
ネギ

スイートコーンは収穫遅れに注意してください。ネギではネギアザミウマの寄生・被害や黒斑病がみられています。

その他

ナス、サトイモやショウガの生育はおおむね順調です。

2. 注意事項など

ハイマダラノメイガ（ダ イソシクムシ）の対策

キャベツなどのアブラナ科野菜で注意が必要です。幼虫が幼植物の芯葉を食害し、生育がとまり収穫できなくなることがあります（発生時期：8月中旬～10月上旬）。下記を参考に定植後、生育期（9月末まで）に早めに薬剤散布してください。

ダイコン、キャベツ、ハクサイ、ブロッコリーのハイマダラノメイガ等防除の主な散布薬剤（令和8年7月末現在）

薬剤名	IRAC コード	ダイコン				キャベツ				ハクサイ				ブロッコリー			
		ハイマ ダラノ メイガ	アオム シ	ヨトウ ムシ	ハスモ ンヨト ウ	ハイマ ダラノ メイガ	アオム シ	ヨトウ ムシ	ハスモ ンヨト ウ	ハイマ ダラノ メイガ	アオム シ	ヨトウ ムシ	ハスモ ンヨト ウ	ハイマ ダラノ メイガ	アオム シ	ヨトウ ムシ	ハスモ ンヨト ウ
アディオソ乳剤	3A	○	○	○			○	○			○	○					
ディアナSC	5	○*	○*	○*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アフーム乳剤	6	○	○			○	○	○	○		○	○			○	○	○
フェニックス顆粒水和剤	28	○				○	○	○	○		○	○	○	○		○	○
ブレバソソフロアブル5	28	○*	○*	○*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
プロフレアSC	30	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グレーシア乳剤	30	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：対象害虫に登録があることを示す

○*：間引き菜を出荷する場合は使用できない

3. 気象情報

関東甲信地方1か月予報（8/15～9/14）：気象庁8/13発表

平均気温は高い確率 60%。1週目は平年並みまたは高い確率 40%。天気は数日の周期で変わる。

→気温は高めの傾向で天気は周期的に変わる。